



बाली: मुला

बाली उत्पादन प्रविधि

माटो	पानी निकास सजिलै हुने, मध्यम दुमट वा मलिलो बलौटे माटो । पानी जम्ने खालको माटोमा मुला खेती राम्रो हुँदैन ।
हावापानी	बीउ उम्रनका लागि २५ देखि ३० डिग्री सैन्टीग्रेड तातोपनाको आवश्यकता पर्दछ ।
मौसम	स्थानीय हावापानी, समय र चलन अनुसार लगाउने मौसम निर्भर गर्दछ ।
बीउ दर	८ - १० किलोग्राम प्रति हेक्टर
लगाउने दूरी	३० से.मी. x १० से.मी.
मलखाद	एक हेक्टर जग्गामा, प्राङ्गारिक मलको मात्रा : १५-२५ टन राम्ररी पाकेको मल बीउ छर्नु भन्दा पहिले माटोमा मिलाउने । रासायनिक मलको मात्रा: पहिलो : बेनी उम्रेको ८-१० दिन पछि ६०:६०:१५० किलोग्राम नाइट्रोजन:फस्फोरस:पोटास टपड्रेस गर्ने दोश्रो : बेनी उम्रेको २०-२५ दिन पछि ६०:६०:१५० किलोग्राम नाइट्रोजन:फस्फोरस:पोटास टपड्रेस गर्ने बोरोन र क्याल्सियम नाइट्रेट बेनी उम्रेको २०-२५ दिनपछि छर्ने ।
सिंचाई	विरुवाको बृद्धिविकासका लागि सिंचाई अत्यन्त आवश्यक छ विशेष गरी जराको विकास हुने वेलामा सिंचाईको अति आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ माटोको चिस्यान र विरुवाको अवस्था हेरी सिंचाई गर्नु पर्छ ।

जरुरी नोट:

माथि बर्णन गरिएको खेती प्रविधि हावापानी, माटोको प्रकार, अन्य जैविक तथा अजैविक दबाव आदिका कारण ठाउँ र अवस्था हेरी फरक पर्न सक्दछ ।

सियान सीडससँग मिलेर खेती गरौं !